Par m. daniel correspondant

[redacted]

Lu une fois

Lu 2 fois

Observation sur la ruption de plusieurs Muscles dans le Cadavre d'un Noyé

Le 15e fevrier 1739. en dissequant le cadavre du nommé françois Guionard forçat sur la galere La brave agé de 38. ans tres gros et fort grand.

J'ay remarqué 1°. apres avoir levé les teguments et la graisse jusqu'a la membrane commune qui enveloppe le grand pectoral, que ce muscle etoit absolument cassé a deux pouces de son insertion, et sa membrane dans son integrité, la Ruption de ce muscle me donna lieu d'examiner tous les autres grands muscles comme les biceps des deux avant bras, ceux des jambes, les grands psoas, les demi membraneux, et le grêle interne que je trouvay aussy Rompus net dans leur milieu, et leurs membranes communes entierres, le Reste des autres muscles etoit dans son etat naturel de meme que les visceres contenus dans les trois ventres.

Le forçat dont je viens de parler tomba dans la mer le 8e du meme mois de fevrier accompagné d'un autre avec lequel il estoit enchainé, et ces deux cadavres resterent au fond de l'eau jusqu'au 14e du dit mois n'ayant pû estre plutot pêchés a cause du mauvais temps, on trouva lesdits cadavres etroittement embrassés l'un avec l'autre et sans autre lesion que les quatre dents incisives de la machoire superieure, et les deux

ARC 52 n° 79 (A)

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

dents Canines de Carseéa, Sans aucune Contusion —
dans aucun Endroit du corps ny aucune Echimose, La
Langue Etoit vn peu Coupée endessous, Les dits forcats
ne Reparurent plus Sur l'Eau depuis Le moment quils y
tomberent, La pesanteur de leurs chaines Les Entraisna
Jusqu'au fond de leau ou ils resterent jusqu'au moment
quils furent peschés.

Il y a toutte apparence que la Ruption de ces
muscles n'est arrivée qu'en consequence des Violents
efforts que ces miserables firent pour Se degager de
Leurs chaines affin d'Eviter la mort.

Lu une fois

Lu 2e fois

Dissertation chirurgicale

Sur vne nouvelle methode de Sonder La Vessie —
Vrinaire, demontrée publiquement Le 2. avril 1740.
apres avoir fait l'Experience Sur trois cents cadavres
que jay Sondés plus de vingt fois chaque, et pour
Le moins trente Sur des vivants avec vne Seulle
main droite ou gauche Sans toucher la Verge
qu'avec La Sonde Seulement et avec vne grande
facilité.

Les difficultés qui Se Rencontrent tous les jours dans le
passage de l'algalie, Lorsquon est obligé de l'introduire dans
La Vessie Vrinaire, soit a l'occasion d'une Retention d'Vrine,
d'une pierre ou autre chose, produisent asséz Souvent
des hemoragies considerables, des inflamations insurmontables,
et Souvent la gangrene; tous ces accidents sont presque
toujours occasionnés par la façon avec laquelle on

jntroduit La Sonde dans La Vessie en Sondant par le grand tour, ou Sur le Ventre ;

La Scituation que londonne aux malades pour les Sonder par le grand tour consiste a les faire asseoir Sur Le bord dune chaise appuyés Sur le dossier, ou couchés dans Leur lit les genoux vn peu Elevés, et les cuisses Ecartées Lune de lautre on prend Ensuitte la Sonde de La main droite et la verge quon Suspend de la gauche, toutes ces circonstances Selon nous parroissent non Seullement jnutilles, mais même s'opposent comme nous lavons vû Souvent a l'jntroduction de la Sonde dans la Vessie ; pour le prouver jl ne Sagit que de rappeller La Situation que londonne aux malades.

1°. L'Ecartement des cuisses ne peut Se faire quon ne distende Les corps caverneux qui composent la verge, et que luretre qui se trouve attaché au milieu Jmmediatement et audessous de ces corps ne la Retressisse dans Sa longueur et par consequent ne Soit moins en Etat de recevoir La Sonde pour Entrer dans La Vessie.

Plus vne partie est tendüe et plus elle est Susceptible de Sentiment, Plus vn canal membraneux est allongé et plus Son diametre diminue,

Plus vn canal ~~allongé~~ [arqué] est relevé, plus jl en ~~tendre~~ tendu, moins louverture en droite et moins la meme ouverture est large et pour peu que La Sonde touche vn Vaisseau auquel distendu elle le dechire.

La Verge estant composée des deux corps caverneux, et de Luretre vnis Ensemble lorsquelle est allongée et Relevée de même que les genoux forment vn Obstacle considerable a L'jntroduction de la Sonde, attendu que par l'Extention de la verge Le Replis ~~ment franeux~~ membraneux Scitué audela de la bulbe de luretre, appellé par le Celebre Monsieur Petit chirurgien Le diaphragme jnferieur de luretre, traitté des Accres de M. Degarengeot page 299. et dans le 2e. tome des operations du meme autheur nouvelle Edition page 40. attendu que par l'Elevation et l'Extention de la Verge ce Replis ~~ment franeux~~ membraneux bouche

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

presquentierement Lorifice de la Vessie, c'est aussy ce qui ~~nous~~ nous
a fait reflechir sur une autre methode de Sonder beaucoup
plus courte et plus facile, et si j'ose le dire infiniment plus
avantageuse, et moins penible aux malades et aux chirurgiens
ces derniers devant toujours applanir autant qu'il leur est
possible les difficultés qui peuvent se rencontrer en operant.
La methode que je propose se trouve depouillée de tous les
Embaras des deux autres, puisqu'independament de la grande facilité
de Sonder toutes Sortes de Vessies ce qui peut s'exécutter d'une Seulle
main, Soit de la droite ou de la gauche il en resulte même des
avantages Infinis, comme par exemple lorsqu'un chirurgien ~~a~~
a mal a une des mains et que le malade a besoin d'être Sondé
ou que le même malade a une jambe ou une cuisse luxée, ou
fracturée qui l'Empeche de relever les genoux et d'écarter les
cuisses, La Verge N'estant pas Etendüe et restant dans Son
Etat naturel Le canal se trouve plus court, et plus large et
presque droit et pour lors la Sonde Roullant avec facilité
dans le du canal trouve d'elle même son passage et l'on ne
risque pas de dechirer le tissus Spongieux de l'urethre et son principe
qui est tout ~~[illegible]~~ membraneux de même que le Repli ou le diaphragme
Inferieur dont nous venons de parler; on Evitte aussy par cette
methode les hemoragies qui sont de tous les accidents les plus
a craindre.
Nous Exceptons cependant de cette nouvelle methode tous les
malades dont le canal de l'urethre en absolument Retresi
En consequence des cicatrices qui se sont formées dedans a la
Suitte des gonorhées, la Sonde dans ce cas nous a toujours
paru pernicieuse Excepté celles de plomb.
La Maniere d'introduire la algalie Selon notre nouvelle
methode consiste a faire Etendre un malade Sur Son lit
ou dans les fesses un peu Relevées, et les jambes Etendües
Sans relever en aucune maniere les genoux ny les Ecarter,
on regarde ensuitte l'Extremités de la verge pour S'assurer
Si l'urètre est ouvert, on passe du costé droit si c'est de la

maindroite que lon veu Sonder, ou ~~dota~~ a gauche Siceſt
delamain gauche, on prend lalgalie dom on poſe Lepavillon
dans la paume ou le creux delamain, et le Corps appuyé
Sur la partie moyenne du doigt mediuм, le pouce allongé deſsus,
dememe que lindicatif, et de cette façon lon porte la ditte Sonde
perpendiculairement jusqu'au bord de luretre ou on lappuye
du bec, et on fait legrand tour a la fin duquel on Releve
un peu Le poignet pour faire glisser la Sonde dans la veſsie
cequi ſexecutte avec tant de facilité quon lui fait en capable
defaire cette operation comme jen ay fait faire plusieurs
fois lexperience par mon fils quoy quil navoit pour lors
que Sept ans.

Cequi madonné Lieu demettre cette methode en pratique
ce fut a loccasion d'un malade attaqué d'une violente fievre
maligne Suivie et accompagnée d'une Retention
D'urine considerable pour laquelle jemployay
Inutillement touttes les autres Methodes, cequi me donna
Lieu demettre en usage celle dont jeviens de parler
avec tant de succes que je lay depuis ce temps la toujours
miseen usage, et a fait que je la prefere a touttes les
Les autres par les raisons cy dessus Indiquées et par
Les grands avantages que les malades en peuvent retirer.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 52 n° 79 (b)

n.° 35^{g}3.

1. rupture de muscles chez un noyé
2. nouvelle méthode de [illegible].

par M. Daviel.